

## ΑΣΚΗΣΗ (Θεωρία)

- 1.1 α) Έστω  $f(x)$  η παράσταση με κινητή υποδιαστολή ενός αριθμού  $x$  σε ένα αριθμητικό σύστημα με βάση  $\beta$ . Αν  $n$  είναι το πλήθος των ψηφίων της mantissa και εφαρμοστεί η τεχνική της στρογγύλευσης, να αποδειχθεί ότι :

$$\frac{|x - fl(x)|}{|x|} \leq \frac{1}{2} \beta^{-n+1}$$

- β) Σε ένα αριθμητικό σύστημα με βάση  $\beta = 10$ ,  $n = 4$  και διάστημα για τον εκθέτη  $e$  το  $[m, M] = [-5, 5]$  να βρεθούν :

- (i) η μονάδα μηχανής  $\varepsilon$ , (ii) η μονάδα σφάλματος στρογγύλευσης,  
(iii) ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος κανονικοποιημένος αριθμός κινητής υποδιαστολής και (iv) σε ποια διαστήματα συμβαίνει **υποχείλιση (underflow)**.

- 1.2 Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 - 5x + 4$  και οι αριθμοί  $\bar{x}_1 = 2.302$  και  $\bar{x}_2 = 0.2005$  με ακρίβεια 4 σημαντικών ψηφίων. Για τον υπολογισμό των τιμών  $f(\bar{x}_1)$  και  $f(\bar{x}_2)$  να εφαρμόσετε (I) τη μέθοδο της **αντικατάστασης** και (II) τη μέθοδο του **σχήματος Horner** ( $f(x) = x(x - 5) + 4$ ) με αριθμητική 4 σημαντικών ψηφίων. Για κάθε μέθοδο να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση

- α) Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα των ποσοτήτων  $f(\bar{x}_1)$  και  $f(\bar{x}_2)$ .  
β) Το μέγιστο απόλυτο σχετικό σφάλμα των ποσοτήτων  $f(\bar{x}_1)$  και  $f(\bar{x}_2)$ .  
γ) Τι συμπεράσματα εξάγετε σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων στα (α) και (β);

- 1.3 α) Δίνεται η εξίσωση  $f(x) = 0$ ,  $f(x) \in C[a, b]$  και  $f(a)f(b) < 0$ , η οποία έχει μια απλή ρίζα  $\xi \in [a, b]$ . Αν η μέθοδος της **Διχοτόμησης** συγκλίνει στη ρίζα  $\xi$  με δεδομένη επιθυμητή ακρίβεια  $\varepsilon$ , να βρεθεί ένα κάτω φράγμα  $n_D$  του αριθμού των επαναλήψεών της.

- β) Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x(x^2 - 3)$ . Να προταθεί και να μελετηθεί, ως προς τη σύγκλισή της (μια τουλάχιστον) επαναληπτική μέθοδος **σταθερού σημείου** της μορφής  $x_{n+1} = g(x_n)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$  για την εύρεση προσεγγιστικής τιμής για κάθε μια από τις ρίζες  $\xi_1 = 0$ ,  $\xi_2 = \sqrt{3}$  της  $f(x)$ . Για τη μελέτη σας λάβετε τα διαστήματα  $[-0.9, 0.9]$  και  $[1.5, 4]$  για τις ρίζες  $\xi_1$  και  $\xi_2$ , αντίστοιχα.

**Εφαρμογή:** Εφαρμόστε μια από τις ανωτέρω προτεινόμενες ε.μ. για τον υπολογισμό της  $\xi_2$  (3 επαναλήψεις).

**1.4** Δίνεται η επαναληπτική μέθοδος **σταθερού σημείου**

$$x_{n+1} = x_n + \lambda(x_n^2 - 3), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

για τον υπολογισμό προσεγγιστικής τιμής μιας ρίζας της εξίσωσης  $f(x) = 0$ , όπου  $f(x) = x^2 - 3$ . Για τη ρίζα  $\xi = \sqrt{3}$  της εξίσωσης :

- α)** Να βρεθεί διάστημα τιμών της παραμέτρου  $\lambda$  ώστε η ε.μ. σταθερού σημείου (1) να συγκλίνει.
- β)** Να βρεθεί τιμή του  $\lambda$  έτσι ώστε η σύγκλιση της ε.μ.σταθερού σημείου (1) να είναι τουλάχιστον τετραγωνική.
- γ)** Να εξετασθεί και να δικαιολογηθεί πλήρως αν αληθεύει ή όχι η παρακάτω πρόταση: Η επαναληπτική μέθοδος **Newton-Raphson (N-R)** για τον υπολογισμό προσεγγιστικής τιμής της ρίζας  $\xi = \sqrt{3}$  είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από την ε.μ. σταθερού σημείου (1) για την τιμή του  $\lambda$  που βρέθηκε στο β).

**1.5 α)** Να αποδειχθεί ότι αν η μέθοδος Newton-Raphson(N-R) συγκλίνει σε μια ρίζα  $\xi$  της εξίσωσης  $f(x) = 0$  βαθμού πολλαπλότητας  $k > 1$ , τότε η σύγκλιση της είναι γραμμική.

- β)** Αν  $f(x) = x(x - 2)^3$ , τότε να επιλέξετε και εφαρμόσετε την πλέον αποτελεσματική μορφή της μεθόδου N-R για τον υπολογισμό της προσεγγιστικής τιμής  $x_3$  (τρεις επαναλήψεις) της ρίζας  $\xi = 2$  της εξίσωσης  $f(x) = 0$  για  $x_0 = 1$ . Ποιά είναι η τάξη σύγκλισης της μεθόδου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

**ΑΣΚΗΣΗ 2** (Υλοποίηση αλγορίθμων-Εφαρμογές)

**Προσοχή:** Η ένδειξη \* πριν από κάποιο ερώτημα σημαίνει ότι το αντίστοιχο ερώτημα είναι προαιρετικό.

**2.1** Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις και τα αντίστοιχα διαστήματα  $[a, b]$  στα οποία περιέχεται μία πραγματική τους ρίζα  $\xi$ .

**α)**  $f_1(x) = (x - 1)^3(x + 2)$ ,  $[0, 2]$       \* **β)**  $f_2(x) = x - \cos x$ ,  $[0.5, 1]$

**γ)**  $f_3(x) = e^x - 2x - 2$ ,  $[1, 2]$       \* **δ)**  $f_4(x) = x^2 - 3$ ,  $[1, 3]$

**2.1.1** Να υπολογιστεί προσεγγιστική τιμή  $x_n$  της ρίζας  $\xi$ , με επιθυμητή ακρίβεια

$\varepsilon = \frac{1}{2} 10^{-6}$  και για διάφορες επιλογές της αρχικής τιμής  $x_0$  υλοποιώντας σε γλώσσα C

(ή C++) τις παρακάτω επαναληπτικές μεθόδους:

\* **(I) Διχοτόμησης**, \* **(II) Σταθερού Σημείου**, **(III) Newton-Raphson (N-R)** και **(IV) Συνδυασμός Διχοτόμησης και N-R**.

Ο συνδυασμός της μεθόδου **N-R** με τη μέθοδο της **Διχοτόμησης** να υλοποιηθεί ως ακολούθως: να εφαρμοστεί αρχικά η μέθοδος Διχοτόμησης για τον εντοπισμό ενός

διαστήματος πλάτους μικρότερου από  $\varepsilon_\Delta = \frac{1}{2} 10^{-2}$  και στη συνέχεια για το διάστημα

αυτό να εφαρμοστεί η μέθοδος N-R με  $x_0$  το μέσο του και με επιθυμητή ακρίβεια

$\varepsilon_{NR} = \frac{1}{2} 10^{-6}$ .

**2.1.2** Να μελετήσετε πειραματικά την ταχύτητα σύγκλισης των επαναληπτικών μεθόδων **(I)- (III)**. Η μελέτη αυτή να γίνει με τον υπολογισμό των ποσοτήτων

$$\frac{|\varepsilon_{n+1}|}{|\varepsilon_n|^p}, \quad \text{αν η ρίζα είναι γνωστή, διαφορετικά } \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_n - x_{n-1}|^p}, \quad p = 1, 2 .$$

**2.1.3** Να συμπληρώσετε(σε αρχείο κειμένου) τον παρακάτω πίνακα αποτελεσμάτων:

## Πίνακας Αποτελεσμάτων

<b>Μέθοδος</b>																
	*I				*II				III				IV			
	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$
$f_1$																
* $f_2$																
$f_3$																
* $f_4$																

\* **2.1.4** Να δικαιολογηθεί, με βάση τη θεωρία, η συμπεριφορά της σύγκλισης σε κάθε περίπτωση. Να σχολιαστεί τόσο η σύγκλιση όσο και η τάξη σύγκλισης.

\* **2.1.5** Να επαληθεύσετε πειραματικά την τιμή του  $\lambda$  στο 1.4 β). Πιο συγκεκριμένα για το διάστημα τιμών του  $\lambda$  στο 1.4 α) να βρεθεί εκείνη η τιμή που παράγει το μικρότερο πλήθος επαναλήψεων.

\* **2.1.6** Να επαληθεύσετε πειραματικά την απάντηση στο 1.4 γ).

\* **2.2** Δίνεται η εξίσωση  $f(x) = 0$  ορισμένη στο διάστημα  $[a, b]$ . Για την αριθμητική επίλυσή της να υλοποιήσετε ένα αλγόριθμο σε γλώσσα C ο οποίος να εκτελεί τα ακόλουθα :

\* **α)** Να διαμερίζει το διάστημα  $[a, b]$  σε  $N$  ίσα υποδιαστήματα.

\* **β)** Να ελέγχει αν υπάρχει μια τουλάχιστον ρίζα της  $f$  στο κάθε υποδιάστημα.

\* **γ)** Αν υπάρχει να εφαρμόζει τη μέθοδο **Newton-Raphson(N-R)** με αρχικό σημείο  $x_0$  το μέσο του συγκεκριμένου υποδιαστήματος, διαφορετικά να προχωρά στο επόμενο υποδιάστημα.

**Εφαρμογές:** (i)  $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ , (ii)  $f(x) = \cos x - e^{-x}$   
στο  $[0, 20]$  με  $N$  και  $\varepsilon$  της επιλογής σας.

**Σημείωση :** Όλες οι υλοποιήσεις στην **Άσκηση 2** να γίνουν σε γλώσσα C (ή C++).

**Οδηγίες για την παράδοση της 1ης Ομάδας Ασκήσεων**

**Υπόδειξη :** Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και ανάπτυξης πνεύματος επικοινωνιακής συνεργασίας η εργασία συνιστάται να γίνει από δύο άτομα (αποκλείεται η συνεργασία περισσοτέρων των δύο ατόμων).

**Προσοχή :** Η ένδειξη \* πριν από κάποιο ερώτημα σημαίνει ότι το αντίστοιχο ερώτημα είναι προαιρετικό.

### **Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης :**

Η **1η Ομάδα Ασκήσεων** θα παραδοθεί ως εξής :

Η **ΑΣΚΗΣΗ 1** θα παραδοθεί σε φάκελο (1 φάκελος ανά ομάδα) στον οποίο θα αναγράφετε εξωτερικά ( Α.Μ. και Ονοματεπώνυμο) και θα περιέχει συμπληρωμένο το **”Φύλλο ερωτήσεων και απαντήσεων”**.

Χρησιμοποιήστε ένα αντίγραφο από το έντυπο (βλ. παρακάτω) και συμπληρώστε τις απαντήσεις σας όπως διευκολύνετε (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά).

Η υποβολή θα γίνει στο γραφείο της Γραμματείας του Α' Τομέα (κ. Γ. Κουνιάς) τη **Δευτέρα 21.5.2007 και ώρα 12-2.**

Η **ΑΣΚΗΣΗ 2** θα υποβληθεί ηλεκτρονικά (με e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [ar\\_analysi@di.uoa.gr](mailto:ar_analysi@di.uoa.gr) από **Τρίτη 22.5.2007** μέχρι και τη **Πέμπτη 24.5.2007** και **ώρα 20:00.**

Η **ΑΣΚΗΣΗ 2** θα πρέπει να περιλαμβάνει: ένα αρχείο με όνομα **ask\_1\_onoma** (επέκταση (.c) ή (.cpp)) που θα περιέχει μόνο τον **πηγαίο κώδικα** για κάθε πρόγραμμα και ένα **αρχείο κειμένου** με όνομα **ask\_1\_onoma** (.doc σε word ) για την περιγραφή των αλγορίθμων, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σας.

Χρησιμοποιήστε ένα αντίγραφο από το έντυπο με τον πίνακα αποτελεσμάτων(βλ. παρακάτω) για να τον συμπληρώσετε.

Στο μήνυμά σας( **e\_mail**) το θέμα (subject) θα είναι μόνο : τα ονοματεπώνυμα, οι ΑΜ της ομάδας (π.χ. Παναγιώτου Γ. 200400158, Πέτρου Φ. 200300291).

Στο μήνυμά σας( **e\_mail**) πρέπει να επισυνάψετε **ΜΟΝΟ** τον **πηγαίο κώδικα** (και όχι εκτελέσιμα αρχεία) και **το αρχείο κειμένου** με την ανάλυση. (Αν σας είναι γνωστό, επιθυμητό θα ήταν, τα αρχεία αυτά να είναι συμπιεσμένα σε ένα αρχείο, με κάποιο πρόγραμμα συμπίεσης, π.χ. winzip ).

**Όροι αποδοχής της 1ης Ομάδας Ασκήσεων**

Για να γίνει αποδεκτή για αξιολόγηση η εργασία σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως μη αποδεκτή:

- Η καθμία από τις Ασκήσεις 1 και 2 να παραδοθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες.
- Σε κάθε συνημμένο αρχείο να γράφετε τα ονόματα (μέχρι δύο) της ομάδας (σαν σχόλιο στον κώδικα).
- Το **αρχείο κειμένου** (στην Άσκηση 2) εκτός από τα ονόματα της ομάδας θα περιέχει τα ακόλουθα:
  - (i) **Εκφώνηση άσκησης**
  - (ii) **Ανάλυση – Σχεδιασμός** : Στην ενότητα αυτή θα περιγράψετε τη μέθοδο λύσης του προβλήματος αναλυτικά).
  - (iii) **Αλγόριθμος**: (Με βάση την ανάλυση-σχεδιασμό στο (ii) θα δώσετε τον αλγόριθμο της μεθόδου επίλυσης του προβλήματός σας.
  - (iv) **Υλοποίηση. Παρουσίαση του κώδικα**
  - (v) **Αποτελέσματα** : Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα (και τα δεδομένα) για τρία τουλάχιστον τρεξίματα του προγράμματός σας με διαφορετικά δεδομένα το καθένα.
  - (vi) **Σχολιασμός**: Σχολιασμός των αποτελεσμάτων με βάση τη θεωρία. Στην ενότητα αυτή θα γράψετε με έντονα (bold) γράμματα, ποια προαιρετικά ερωτήματα υλοποιεί το πρόγραμμά σας .

## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- 1. Σε περίπτωση αντιγραφής ή όμοιου κώδικα συνεπάγεται μηδενική βαθμολογία.
- 2. Η κάθε άσκηση θα πρέπει να λύνεται με βάση τη θεωρία που έχετε διδαχθεί.
- 3. Επίσης, θα λαμβάνεται κυρίως υπόψη η αποτελεσματικότητα της μεθόδου που χρησιμοποιείται με βάση την ύλη που έχετε διδαχθεί.
- 4. Μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης καμία από τις ασκήσεις δεν θα γίνεται δεκτή.
- 5. Η αποστολή μηνύματος σε άλλη διεύθυνση, εκτός αυτής που θα σας ανακοινωθεί, θα καταστήσει το μήνυμα απορριπτέο χωρίς την ενημέρωσή σας.
- 6. Λόγω της ηλεκτρονικής αποστολής της Άσκησης 2 δεν θα γίνεται καμία δικαιολογία αποδεκτή για την μη αποστολή της εντός της προθεσμίας.
- 8. Ο κώδικάς σας θα πρέπει να τρέχει στον μεταγλωττιστή της C ( ή C++) του εργαστηρίου των PC,s, διαφορετικά η άσκησή σας δεν γίνεται δεκτή.
- 9. Η εκφώνηση της άσκησης μπορεί να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα ιστοσελίδα(e-class).

# Φύλλο ερωτήσεων και απαντήσεων

## ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία)

A.M

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. ....

2. ....

**1.1 α)** Έστω  $fl(x)$  η παράσταση με κινητή υποδιαστολή ενός αριθμού  $x$  σε ένα αριθμητικό σύστημα με βάση  $\beta$ . Αν  $n$  είναι το πλήθος των ψηφίων της mantissa και εφαρμοστεί η τεχνική της στρογγύλευσης, να αποδειχθεί ότι :

$$\frac{|x - fl(x)|}{|x|} \leq \frac{1}{2} \beta^{-n+1}$$

- β) Σε ένα αριθμητικό σύστημα με βάση  $\beta = 10$ ,  $n = 4$  και διάστημα για τον εκθέτη  $e$  το  $[m, M] = [-5, 5]$  να βρεθούν :
- (i) η μονάδα μηχανής  $\varepsilon$ , (ii) η μονάδα σφάλματος στρογγύλευσης,
  - (iii) ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος κανονικοποιημένος αριθμός κινητής υποδιαστολής και (iv) σε ποια διαστήματα συμβαίνει **υποχείλιση (underflow)**.



- 1.2** Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 - 5x + 4$  και οι αριθμοί  $\bar{x}_1 = 2.302$  και  $\bar{x}_2 = 0.2005$  με ακρίβεια 4 σημαντικών ψηφίων. Για τον υπολογισμό των τιμών  $f(\bar{x}_1)$  και  $f(\bar{x}_2)$  να εφαρμόσετε **(I)** τη μέθοδο της **αντικατάστασης** και **(II)** τη μέθοδο του **σχήματος Horner** ( $f(x) = x(x - 5) + 4$ ) με αριθμητική 4 σημαντικών ψηφίων. Για κάθε μέθοδο να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση
- α)** Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα των ποσοτήτων  $f(\bar{x}_1)$  και  $f(\bar{x}_2)$ .
  - β)** Το μέγιστο απόλυτο σχετικό σφάλμα των ποσοτήτων  $f(\bar{x}_1)$  και  $f(\bar{x}_2)$ .
  - γ)** Τι συμπεράσματα εξάγετε σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων στα (α) και (β);

- 1.3** α) Δίνεται η εξίσωση  $f(x) = 0$ ,  $f(x) \in C[a, b]$  και  $f(a)f(b) < 0$ , η οποία έχει μια απλή ρίζα  $\xi \in [a, b]$ . Αν η μέθοδος της **Διχοτόμησης** συγκλίνει στη ρίζα  $\xi$  με δεδομένη επιθυμητή ακρίβεια  $\varepsilon$ , να βρεθεί ένα κάτω φράγμα  $n_D$  του αριθμού των επαναλήψεών της.
- β) Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x(x^2 - 3)$ . Να προταθεί και να μελετηθεί, ως προς τη σύγκλισή της (μια τουλάχιστον) επαναληπτική μέθοδος **σταθερού σημείου** της μορφής  $x_{n+1} = g(x_n)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$  για την εύρεση προσεγγιστικής τιμής για κάθε μια από τις ρίζες  $\xi_1 = 0$ ,  $\xi_2 = \sqrt{3}$  της  $f(x)$ . Για τη μελέτη σας λάβετε τα διαστήματα  $[-0.9, 0.9]$  και  $[1.5, 4]$  για τις ρίζες  $\xi_1$  και  $\xi_2$ , αντίστοιχα.
- Εφαρμογή:** Εφαρμόστε μια από τις ανωτέρω προτεινόμενες ε.μ. για τον υπολογισμό της  $\xi_2$  (3 επαναλήψεις).

**1.4** Δίνεται η επαναληπτική μέθοδος **σταθερού σημείου**

$$x_{n+1} = x_n + \lambda(x_n^2 - 3), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

για τον υπολογισμό προσεγγιστικής τιμής μιας ρίζας της εξίσωσης  $f(x) = 0$ , όπου  $f(x) = x^2 - 3$ . Για τη ρίζα  $\xi = \sqrt{3}$  της εξίσωσης :

- α)** Να βρεθεί διάστημα τιμών της παραμέτρου  $\lambda$  ώστε η ε.μ. σταθερού σημείου (1) να συγκλίνει.
- β)** Να βρεθεί τιμή του  $\lambda$  έτσι ώστε η σύγκλιση της ε.μ.σταθερού σημείου (1) να είναι τουλάχιστον τετραγωνική.
- γ)** Να εξετασθεί και να δικαιολογηθεί πλήρως αν αληθεύει ή όχι η παρακάτω πρόταση: Η επαναληπτική μέθοδος **Newton-Raphson (N-R)** για τον υπολογισμό προσεγγιστικής τιμής της ρίζας  $\xi = \sqrt{3}$  είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από την ε.μ. σταθερού σημείου (1) για την τιμή του  $\lambda$  που βρέθηκε στο β).

- 1.5** α) Να αποδειχθεί ότι αν η μέθοδος Newton-Raphson(N-R) συγκλίνει σε μια ρίζα  $\xi$  της εξίσωσης  $f(x) = 0$  βαθμού πολλαπλότητας  $k > 1$ , τότε η σύγκλιση της είναι γραμμική.
- β) Αν  $f(x) = x(x - 2)^3$ , τότε να επιλέξετε και εφαρμόσετε την πλέον αποτελεσματική μορφή της μεθόδου N-R για τον υπολογισμό της προσεγγιστικής τιμής  $x_3$  (τρεις επαναλήψεις) της ρίζας  $\xi = 2$  της εξίσωσης  $f(x) = 0$  για  $x_0 = 1$ . Ποιά είναι η τάξη σύγκλισης της μεθόδου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

## ΑΣΚΗΣΗ 2 (Υλοποίηση αλγορίθμων-Εφαρμογές)

A.M

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. ....

2. ....

### *Πίνακας Αποτελεσμάτων*

<i>Μέθοδος</i>																
	*I				*II				III				IV			
	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$	$x_0$	$x_n$	$f(x_n)$	$n$
$f_1$																
* $f_2$																
$f_3$																
* $f_4$																