



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραμμική Άλγεβρα

Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες

Ευάγγελος Ράπτης

Τμήμα Πληροφορικής

Μέρος I

Έναρξη μαθήματος

Γραμμική άλγεβρα I Ευάγγελος Ράπτης ¹

Τα παρακάτω κείμενα, γράφονται και ενημερώνονται καθημερινά για τις ανάγκες του μαθήματος

Γραμμική άλγεβρα I.

Καλούνται οι φοιτητές να επισημαίνουν λάθη και παραλείψεις.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την **Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012**.

Παρακάτω θα βρείτε συγγράμματα και συνδέσμους σε ηλεκτρονική μορφή, όλα χρήσιμα για τη μελέτη σας:

1. Πρόκειται για το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Τόμος Α, Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Στ. Παπασταυρίδης, Ε. Ράπτης, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2003 Δείτε [εδώ](#)
2. Ένα ακόμη αρκετά καλό βιβλίο Γραμμικής άλγεβρας [εδώ](#)
3. Δείτε επίσης και [εδώ](#) ένα μάθημα για το «Τί είναι η Γραμμική άλγεβρα»
4. Δείτε στη διεύθυνση [εδώ](#) ένα δυνατό υπολογιστικό πακέτο, το οποίο βρίσκεται ελεύθερο στο δίκτυο και θα μας χρειασθεί σύντομα.
5. Δείτε επίσης [εδώ](#) για προετοιμασία το πρώτο μάθημα Γραμμικής άλγεβρας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το χειμερινό εξάμηνο 2009-10. Επίσης δείτε [εδώ](#) και [εδώ](#)

¹Ηλεκτρονική διεύθυνση: eraptis@math.uoa.gr Γραφείο: 211, τηλ. 2107276347 Ηλεκτρονική διεύθυνση Ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος: <http://eclass.uoa.gr/courses/MATH125/>

Οι παράπλευρες σελίδες συζήτησης

Μπορείτε να διατυπώνετε τις απορίες σας και τις σκέψεις σας:

1. Στον σύνδεσμο **Τηλεσυνεργασία**, είναι ο σύνδεσμος αριστερά στη σελίδα του μαθήματος. Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα να γράφετε και λίγα μαθηματικά σύμβολα
2. Στον σύνδεσμο **Περιοχές Συζητήσεων**, αριστερά στη σελίδα του μαθήματος .

Τηλεδιασκέψεις

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν πολλές Τηλεδιασκέψεις. Κάθε Τηλεδιάσκεψη θα ανακοινώνεται έγκαιρα

Μέρος II

Αρχικά μαθήματα

1 Μάθημα 1

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

1.1 Εισαγωγή

Η Γραμμική άλγεβρα² είναι μέρος της προσπάθειας να κατανοήσουμε το χώρο και τον κόσμο γύρω μας.

Θα δούμε στην αρχή σημαντικές έννοιες όπως τα **σύνολα** και οι **απεικονίσεις**.

1.2 Πορεία μελέτης

1. Δείτε από το βιβλίο [Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα](#) τον ορισμό του συνόλου
2. Δείτε και [εδώ](#) μία άλλη ματιά για τα σύνολα
3. Δείτε και [εδώ](#) την ελληνική εκδοχή των παραπάνω
- 4.

Ορισμός 1.1. Δύο σύνολα A και B λέγονται *ίσα* (θα συμβολίζουμε $A=B$) εάν και μόνο εάν έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία

5. Δείτε προσεκτικά τον ορισμό του κενού συνόλου:

Ορισμός 1.2. Το σύνολο που δεν έχει στοιχεία το λέμε **κενό σύνολο** και το συμβολίζουμε με το σύμβολο \emptyset

6. Δείτε από το βιβλίο [Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα](#) τον ορισμό της τομής δύο συνόλων, της ένωσης δύο συνόλων και της διαφοράς δύο συνόλων

²Το βιβλίο αυτό γράφεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου 2012 για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος **Γραμμική άλγεβρα I(121)**
Ευάγγελος Ράπτης Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών

1.3 Γραμμικά συστήματα

Σε επόμενα μαθήματα θα μελετήσουμε συστηματικά τα γραμμικά συστήματα, διότι είναι σημαντικό μέρος της Γραμμικής άλγεβρας. Στο σημερινό μάθημα απλά θέτουμε τα ερωτήματα. Αρχίζουμε με ένα παράδειγμα γραμμικού συστήματος τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους:

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 0 \\(\Sigma) \quad 4x + 5y + 6z &= 0 \\7x + 8y + 9z &= 0\end{aligned}$$

Ερωτήματα

1. Τι είναι το σύνολο λύσεων του συστήματος (Σ) ;
2. Ποια είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (Σ) ;
3. Υπάρχουν άλλα συστήματα με το ίδιο σύνολο λύσεων;
4. Έχει το σύστημα (Σ) πεπερασμένο ή άπειρο σύνολο λύσεων;
5. Ποιο είναι το «απλούστερο» κατά την γνώμη σας γραμμικό σύστημα με το ίδιο σύνολο λύσεων όπως το (Σ) ;

Τέλος του πρώτου μαθήματος

2 Μάθημα 2

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

2.1 Εσωτερικά γινόμενα

1. Το σύνολο ζευγών πραγματικών αριθμών το συμβολίζουμε με R^2 . Στο σύνολο αυτό ορίζουμε το εσωτερικό γινόμενο ως εξής:

$$(\alpha_1, \alpha_2) \cdot (\beta_1, \beta_2) = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2$$

2. Το σύνολο τριάδων πραγματικών αριθμών το συμβολίζουμε με R^3 . Στο σύνολο αυτό ορίζουμε το εσωτερικό γινόμενο ως εξής:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cdot (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3$$

Τα εσωτερικά γινόμενα έχουν έναν σημαντικό ρόλο στη μελέτη της Γραμμικής άλγεβρας. Θα δούμε αρκετά στα επόμενα μαθήματα

2.2 Αρχίζοντας τη μελέτη της Γραμμικής άλγεβρας

1. Δείτε ξανά μία εισαγωγή στην Γραμμική άλγεβρα του καθηγητή W.Strang, MIT [εδώ](#)
2. Διαβάστε την **Εισαγωγή** από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α»³
3. Ρίξτε επίσης μια ματιά και στη διεύθυνση [Έγκυκλοπαίδεια wikipedia](#). Στη διεύθυνση αυτή θα βρείτε και άλλα ιστορικά στοιχεία, όπως και υλικό για τη Γραμμική άλγεβρα
4. Αρχίζουμε να μελετάμε τους **πίνακες**. Οι πίνακες είναι πρωταρχικής σημασίας στο μάθημα αυτό.
Συνοπτικά μιλώντας (ο ακριβής ορισμός θα δοθεί στη συνέχεια) **πίνακας** είναι μία ορθογώνια διευθέτηση αντικειμένων. Για παράδειγμα το σύμβολο

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

είναι ένας πίνακας 4 γραμμών και 3 στηλών ή ένας 4×3 πίνακας. Ο όρος στα αγγλικά είναι matrix.

³Το βιβλίο αυτό θα το βρείτε ηλεκτρονικά από την αρχική σελίδα του μαθήματος

2.3 Μελέτη εισαγωγικών εννοιών

1. Δείτε από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α» τον ορισμό του **καρτεσιανού γινομένου συνόλων**
2. Δείτε από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α» τον ορισμό της **σχέσης ισοδυναμίας**

Ορισμός 2.3. Έστω A ένα μη-κενό σύνολο. **Διαμέριση** του συνόλου A είναι μία οικογένεια υποσυνόλων του $A_i, i \in I$ με τις παρακάτω ιδιότητες

1. $A_i \neq \emptyset \quad \forall i \in I$
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ εάν $i \neq j$
3. $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Θα πρέπει κανείς να σταθεί πολύ στον ορισμό αυτό ξεκινώντας τη μελέτη στην Άλγεβρα.

Στο σημείο αυτό δείτε το βίντεο [εδώ](#)

Κάθε διαμέριση δημιουργεί μία σχέση μεταξύ των στοιχείων του A ως εξής:

Το στοιχείο x του A σχετίζεται με το στοιχείο y του A εάν το x και το y βρίσκονται σε κάποιο A_i και τα δύο

Θα συμβολίζουμε $x \sim y$

Η παραπάνω σχέση έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

1. $x \sim x$ για κάθε στοιχείο x του A . Αυτό είναι άμεσο. Η ιδιότητα αυτή λέγεται αυτοπαθής
2. Αν $x \sim y$ τότε $x, y \in A_i$ για κάποιο A_i και άρα $y, x \in A_i$, δηλαδή $y \sim x$. Η ιδιότητα αυτή λέγεται συμμετρική
3. Αν $x \sim y$ και $y \sim z$, τότε τα $x, y, z \in A_i$ για κάποιο κοινό A_i οπότε $x \sim z$. Η ιδιότητα αυτή λέγεται μεταβατική

Μπορούμε εδώ να διατυπώσουμε την παρακάτω

Πρόταση 2.4. Έστω A ένα μη κενό σύνολο. Κάθε διαμέριση του συνόλου A επάγει(δημιουργεί) μία σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο A

Απόδειξη Άμεση από την παραπάνω συζήτηση

Στην πραγματικότητα αν A ένα μη κενό σύνολο, μία σχέση ισοδυναμίας στο A είναι ένα μη κενό υποσύνολο R του καρτεσιανού γινομένου $A \times A$ δηλαδή $R \subseteq A \times A$ με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. $(x, x) \in R$ για κάθε $x \in A$
2. Αν $(x, y) \in R$, τότε $(y, x) \in R$
3. Αν $(x, y) \in R$ και $(y, z) \in R$, τότε $(x, z) \in R$

Πολλές φορές θα συμβολίζουμε ή $(x, y) \in R$ ή xRy ή $x \sim y$

Με βάση αυτόν το γενικό ορισμό της σχέσης ισοδυναμίας στο μη κενό σύνολο A δημιουργούμε υποσύνολα ως εξής:

Αν $x \in A$, τότε $[x] = \{y \in A \mid y \sim x\}$

Κάθε υποσύνολο $[x]$ όπως παραπάνω θα το ονομάζουμε **κλάση ισοδυναμίας με αντιπρόσωπο το x**

Πρόταση 2.5. Έστω \sim μία σχέση ισοδυναμίας στο μη-κενό σύνολο A

1. Κάθε κλάση ισοδυναμίας $[x]$ περιέχει το x διότι $x \sim x$. Άρα κάθε κλάση ισοδυναμίας είναι μη-κενό σύνολο
2. Αν $[x] \cap [y]$ δύο κλάσεις ισοδυναμίας, τότε είτε $[x] = [y]$ είτε $[x] \cap [y] = \emptyset$
3. $\bigcup_{x \in A} [x] = A$

Απόδειξη: Το σημείο 1 έχει ήδη αποδειχθεί

Για το σημείο 2 τώρα. Αν $[x] \cap [y] = \emptyset$ είναι δεκτό. Αν $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, τότε υπάρχει $\omega \in [x] \cap [y]$ και έτσι $x \sim \omega$ και $y \sim \omega$. Τότε όμως λόγω της μεταβατικής ιδιότητας έχουμε $x \sim y$ και έτσι $[x] = [y]$

Η τρίτη απαίτηση είναι άμεση, διότι κάθε $x \in [x]$ και έτσι $\bigcup_{x \in A} [x] = A$

Καταλήγουμε έτσι ότι το σύνολο $\{[x] \mid x \in A\}$, δηλαδή το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας σχηματίζει μία διαμέριση του A

Καταλήξαμε στο παρακάτω πολύ σημαντικό:

Θεώρημα 2.6. Έστω A ένα μη κενό σύνολο. Υπάρχει μία 1-1 και επί σχέση

$$\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{I}$$

όπου \mathcal{D} το σύνολο των διαμερίσεων του A και \mathcal{I} το σύνολο των σχέσεων ισοδυναμίας. Κάθε διαμέριση απεικονίζεται σε μία σχέση ισοδυναμίας που περιγράψαμε πιο πάνω. Αντίστροφα κάθε σχέση ισοδυναμίας δημιουργεί μία διαμέριση που επίσης περιγράψαμε πιο πάνω. Η μία απεικόνιση είναι αντίστροφη της άλλης

Ορισμός 2.7. Έστω A ένα μη κενό σύνολο και \sim μία σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο αυτό.

1. Το σύνολο $\{[x], x \in A\}$ δηλαδή το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας λέγεται σύνολο-πηλίκο και συμβολίζεται A/\sim
2. Η απεικόνιση $A \longrightarrow A/\sim$ με $x \longmapsto [x]$ λέγεται **προβολή**

2.4 Και άλλες σκέψεις

1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών \mathbb{R} ορίζουμε τη σχέση:

$a \sim b \iff$ η διαφορά $a - b$ είναι ακέραιος αριθμός.

Εξετάστε εάν η σχέση αυτή είναι σχέση ισοδυναμίας. Βρείτε και τις κλάσεις ισοδυναμίας αν είναι πράγματι σχέση ισοδυναμίας. Σκεφθείτε μία γεωμετρική προσέγγιση.

2. Στο σύνολο των ακεραίων αριθμών \mathbb{Z} ορίζουμε τη σχέση:

$a \sim b \iff$ το 2 διαιρεί τη διαφορά $a - b$.

Δείξτε ότι η σχέση αυτή είναι σχέση ισοδυναμίας. Βρείτε και τις κλάσεις ισοδυναμίας

Τέλος του δευτέρου μαθήματος

3 Μάθημα 3

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

3.1 Μελέτη εισαγωγικών εννοιών

1. Δείτε από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α»⁵ τον ορισμό της απεικόνισης και τα παραδείγματα
2. Πότε μία απεικόνιση λέγεται ότι είναι 1-1;, πότε επί;

3.2 Πορεία μελέτης

1. Μελετήστε την παράγραφο 2.1 του κεφαλαίου 2 (Πίνακες και Γραμμικές εξισώσεις) σελίδα 29 από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α»⁶
2. Μελετήστε τους ορισμούς 2.2.1 , 2.2.2 , 2.2.3 , 2.2.4 καθώς και τα παραδείγματα 2.2.5 , 2.2.6 και 2.2.7 σελ 31 και 32 από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α»
3. Δείτε στη διεύθυνση [εδώ](#) σχετικά με τους πίνακες.

3.3 Ασκήσεις

Οι λύσεις των παρακάτω ασκήσεων να γίνουν στοιχειωδώς.

Άσκηση 3.1. 1. Να βρεθεί το σύνολο λύσεων του παρακάτω συστήματος

$$3x + 5y + 6z = 28$$

$$x + y + z = 6$$

δηλαδή να βρεθεί το σύνολο Λ όλων των τριάδων (ξ_1, ξ_2, ξ_3) πραγματικών αριθμών, έτσι ώστε αν αντικαταστήσουμε $x = \xi_1, y = \xi_2, z = \xi_3$, ικανοποιούνται και οι δύο εξισώσεις του συστήματος.

2. Να κάνετε το ίδιο και για το σύστημα

$$\begin{aligned} 3x + 5y + 6z &= 0 \\ x + y + z &= 0 \end{aligned}$$

3. Αν Λ το σύνολο λύσεων του πρώτου συστήματος και Λ' το σύνολο λύσεων του δεύτερου, να βρεθεί η τομή $\Lambda \cap \Lambda'$

⁵Το βιβλίο αυτό θα το βρείτε ηλεκτρονικά από την αρχική σελίδα του μαθήματος

⁶Το βιβλίο αυτό θα το βρείτε ηλεκτρονικά από την κεντρική σελίδα του μαθήματος

3.4 Σχόλια για τις προτεινόμενες ασκήσεις

1. Για την πρώτη άσκηση βρίσκουμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι υπάρχει έστω και μία τριάδα (ξ_1, ξ_2, ξ_3) πραγματικών αριθμών, που είναι λύση. Αργότερα θα πούμε «σίγουρες» διαδικασίες για εύρεση λύσης. Μετά (αφού δηλαδή εξασφαλίσουμε ότι το σύνολο λύσεων Λ είναι μη-κενό) σκεφθείτε «γεωμετρικά» τι περιμένουμε να είναι το Λ . Η πρώτη εξίσωση, λοιπόν, η $3x + 5y + 6z = 28$ του συστήματος από μόνη της παριστάνει ένα επίπεδο στον χώρο που ζούμε⁷. Το ίδιο και η δεύτερη εξίσωση $x + y + z = 6$ παριστάνει ένα επίπεδο. Επιστρατεύουμε εδώ τη φαντασία μας για να μαντέψουμε το αποτέλεσμα και τη μαθηματική μας διαίσθηση για να προχωρήσουμε αυστηρά. Αν τα δύο επίπεδα είναι παράλληλα, τότε δεν τέμνονται και έτσι το σύστημα **δεν** έχει λύσεις, δηλαδή το Λ είναι το κενό σύνολο. Υπάρχουν τώρα οι περιπτώσεις τα δύο επίπεδα να ταυτίζονται ή τα δύο επίπεδα να τέμνονται αλλά να μην ταυτίζονται. Σκεφθείτε λίγο την προσέγγιση αυτή αφού πρώτα δείτε και το βίντεο [εδώ](#)
2. Η δεύτερη άσκηση αντιμετωπίζεται όπως και η προηγούμενη. μόνο που στην περίπτωση αυτή κατά προφανή τρόπο το σύστημα έχει λύση την $(0,0,0)$ Σύστημα σαν αυτό το ονομάζουμε **ομογενές σύστημα**.
3. Για το τρίτο ερώτημα σκεφθείτε ότι έχουμε να λύσουμε ένα σύστημα 4 εξισώσεων

⁷ Αυτό χρειάζεται απόδειξη

(β') Ο επαυξημένος πίνακας C' του συστήματος Σ' προκύπτει από τον επαυξημένο πίνακα C του συστήματος Σ προσθέτοντας στην πρώτη γραμμή τη δεύτερη γραμμή

3. **Σημαντική παρατήρηση.** Το σύνολο λύσεων Λ του συστήματος (Σ) είναι ίσο με το σύνολο λύσεων Λ' του συστήματος Σ'

Απόδειξη⁸ Έστω $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ ένα στοιχείο του Λ . Τότε η n -άδα αυτή ικανοποιεί κάθε εξίσωση του Λ και προφανώς κάθε εξίσωση του Λ' και αντίστροφα.

4. Αν κάποια εξίσωση του συστήματος Σ πολλαπλασιασθεί με ένα αριθμό διαφορετικό του μηδενός προκύπτει ένα σύστημα Σ' , του οποίου το σύνολο λύσεων εξακολουθεί να είναι το ίδιο με το σύνολο λύσεων του Σ
5. Αν αλλάξουμε τη θέση δύο εξισώσεων του Σ το σύνολο λύσεων **δεν** μεταβάλλεται
6. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιους μετασχηματισμούς στο γραμμικό σύστημα Σ , χωρίς να μεταβληθεί το σύνολο λύσεων Λ , με σκοπό πάντα να καταλήξουμε σε απλούστερο σύστημα.
7. Οι μετασχηματισμοί του συστήματος Σ , οδηγούν στους παρακάτω μετασχηματισμούς τους δύο πίνακες A του συστήματος και C του επαυξημένου πίνακα του συστήματος.
- (α') Πολλαπλασιασμός μιας γραμμής του πίνακα με ένα στοιχείο λ διάφορο του μηδενός
- (β') Πολλαπλασιασμός της k -γραμμής με λ και πρόσθεσης του αποτελέσματος στην i -γραμμή, $k \neq i$
- (γ') εναλλαγή δύο γραμμών
- 8.

Ορισμός 4.2. Οι παραπάνω μετασχηματισμοί πινάκων λέγονται **στοιχειώδεις μετασχηματισμοί γραμμών**. Δύο πίνακες A και B που προκύπτει ο ένας από τον άλλον με επαναλήψιμη στοιχειωδών μετασχηματισμών γραμμών λέγονται **γραμμοϊσοδύναμοι πίνακες**

4.4 Πορεία μελέτης

1. Μελετήστε καλά τα παραπάνω
2. Δείτε τον ορισμό του **κλιμακωτού πίνακα** από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α.

⁸Ο αναγνώστης καλείται να κάνει την απόδειξη λεπτομερώς

3. Δείτε τον ορισμό του **ανηγμένου κλιμακωτού πίνακα** από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα Τόμος Α.
4. Δείτε ξανά το βίντεο με την ομιλία του καθηγητή G.Strang [εδώ](#)

4.5 Και άλλες Ασκήσεις

1. Έστω Σ και Σ' δύο γραμμικά συστήματα των οποίων οι επαυξημένοι πίνακες C και C' αντίστοιχα ικανοποιούν τη σχέση $C' = \lambda \cdot C$ με $\lambda \neq 0$. Εξετάστε εάν τα σύνολα λύσεων του Σ και Σ' είναι ίσα
2. Δύο γραμμικά συστήματα Σ και Σ' έχουν επαυξημένους πίνακες C και C' αντίστοιχα. Η μόνη διαφορά των πινάκων αυτών είναι ότι η πρώτη γραμμή του C' είναι το άθροισμα της πρώτης και της δεύτερης γραμμής του C . Εξετάστε εάν το Σ και το Σ' έχουν το ίδιο σύνολο λύσεων

3. Δίνεται ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

Να βρείτε ένα ανηγμένο κλιμακωτό πίνακα A' , ο οποίος να είναι γραμμοϊσοδύναμος με τον A

4. Δείξτε ότι δύο οποιοδήποτε ανηγμένοι κλιμακωτοί πίνακες γραμμοϊσοδύναμοι με τον πίνακα A είναι ίσοι. Διατυπώστε και αποδείξτε ένα θεώρημα σχετικά με τους ανηγμένους κλιμακωτούς πίνακες κάθε πίνακα.

Τέλος του τετάρτου μαθήματος

Σημειώματα

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστημίων Αθηνών, Ράπτης Ευάγγελος 2015. «Γραμμική Άλγεβρα, Ενότητα 1^η, Εισαγωγικές Έννοιες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://opencourses.uoa.gr/courses/D129/>.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

